



The Chemical Company

Juwel® Top

Fungicida

(Fenpropimorfo + Kresoxim-metilo + Epoxiconazol)

Fungicida de avanzada tecnología que fortalece y protege sus cereales de las principales enfermedades, maximizando su rendimiento y calidad.

Beneficios de Juwel® Top

- Fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante.
- Prolongada persistencia de acción.
- Altamente eficaz para el control de las enfermedades foliares en trigo, cebada, remolacha y achicoria industrial.
- Desencadena al interior de la planta una serie de procesos fisiológicos favorables al vigor, calidad del grano y rendimiento.
- Tiene tres ingredientes activos con tres diferentes modos de acción, ideal para el manejo de resistencia.



Juwel® Top permite a sus tres activos controlar hongos y patógenos en sitios diferentes y específicos, protegiendo al cultivo y permitiéndole expresar su potencial de rendimiento.

Triple eficacia fungicida es sanidad asegurada

3 Ingredientes activos - 3 sitios de acción

Sus tres ingredientes activos actúan a nivel de **mitocondrias**, bloqueando la cadena respiratoria y a nivel de **ribosomas** bloqueando la síntesis de ergosterol.

Mitocondrias
Bloquea la cadena
respiratoria

Ribosomas
Bloquea la síntesis del
ergosterol

Ribosomas
Bloquea en otro punto la
síntesis del ergosterol

Instrucciones de uso


Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigos (blancos y candeales), cebada, avena, triticale, centeno	Royas o polvillos (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. coronata</i>) Escaldadura de la cebada (<i>Rynchosporium secalis</i>) Helmintosporiosis (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>P. teres</i> , <i>P. tritici-repentis</i> y <i>Cochliobolus sativus</i>) Septoriosis (<i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Septoria nodorum</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>) Mancha ocular (<i>Tapesia yallundae</i>)	0,8 - 1,0 L/ha	Aplicar, de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30°C). Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha. Utilizar la dosis mayor en condiciones de alta presión de las enfermedades. Aplicaciones por temporada: máximo 2.
Aplicaciones Terrestres			
Remolacha azucarera	Ramularia (<i>Ramularia beticola</i>) Oídio (<i>Erysiphe betae</i>), Cercospora (<i>Cercospora betae</i>), Roya (<i>Uromyces betae</i>)	0,75 L/ha	Aplicar al inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Repetir si es necesario 20 a 30 días después de la primera aplicación. Utilizar 200 a 400 L agua/ha. Aplicaciones por temporada: máximo 2.
Achicoria Industrial	Oídio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0,5 - 0,75 L/ha	Aplicar al inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar la dosis menor en condiciones de baja presión de la enfermedad. Repetir si es necesario 20 a 30 días después de la primera aplicación. Utilizar 200 a 400 L agua/ha. Aplicaciones por temporada: máximo 2.

Época de aplicación en trigo

BBCH 29-51

Juwel® Top

Fungicida



© es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

www.basf.cl/agro
 BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370.
 Rancagua: Fono: 96432089. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750.
 Fono: 97464533. Osorno: Fono: 93285393



Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.