

FICHA TÉCNICA

SISTIVA®

Fluxapiroxad
Fungicida / Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Fluxapiroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4'5'-trifluorobifenil-2-il)pirazole-4-carboxamida..... 28.70
(Equivalente a 333 g i.a./L)

INGREDIENTES INERTES:

Anticongelante, colorante, agentes dispersantes, antiespumante, bactericida, espesante, ajustador de pH y Solvente..... 71.30

Total 100.00 %

REGISTRO SANITARIO: RSCO-FUNG-0398-0724-064-28.70

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL / 100 kg de semilla	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Maíz (0) Sorgo (0)	Pudrición de raíz y cuello	<i>Rhizoctonia solani</i>	100-225	Realizar 1 aplicación en tratamiento de semilla. Una vez seca la semilla se procede a sembrarla de acuerdo a las prácticas culturales acostumbradas.
Avena (0) Cebada (0) Centeno (0) Trigo (0)	Pudrición de raíz y cuello	<i>Rhizoctonia solani</i>	100-225	Realizar 1 aplicación asperjando la solución a la semilla, diluir la dosis en 3.75 L de agua / 100 kg de semilla, secar y sembrar.

Cacahuete (SL) Chícharo (SL) Frijol (SL) Frijol ejotero (SL) Garbanzo (SL) Lenteja (SL) Soya (SL)	Enfermedades del suelo	<i>Fusarium sp./ Rhizoctonia ssp.</i>	50-225	Realizar una aplicación en tratamiento de semilla
---	------------------------	---	--------	---

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Limite

Tiempo de reentrada a las áreas de siembra; es inmediatamente.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Recomendamos agitar el producto de forma previa al tratamiento. EL envase del producto debe abrirse cuidadosamente usando el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. SISTIVA es una formulación que debe diluirse en agua suficiente para asegurar una buena impregnación de la semilla a tratar, el cual deberá efectuarse sólo con equipo adecuado y diseñado para este fin con el objeto de obtener una buena impregnación, cubrimiento uniforme y evitar daño a la semilla.

CONTRAINDICACIONES

La semilla tratada con insecticida o fungicida no deberá usarse como alimento, forraje, o producción de aceite. SISTIVA no debe aplicarse sin el equipo de protección personal necesario. No tratar mayor cantidad de semilla de la necesaria para la siembra, los sobrantes deberán germinarse para evitar su uso con fines alimenticios o forrajeros.

Asegúrese que la semilla tratada quede completamente cubierta al momento de la siembra. SISTIVA no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar las tolerancias e intervalos establecidos en el país destino.

INCOMPATIBILIDAD

De acuerdo el estudio de compatibilidad de mezclas con otros productos se recomienda mezclar SISTIVA con formulaciones para tratamiento de semilla en Suspensión Concentrada. Mantenga la mezcla en agitación, hasta utilizarse.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Transporte este producto en su envase original, perfectamente cerrado y claramente etiquetado, y almacene en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado. Nunca transportar o almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com