

FICHA TECNICA

Acronis®

tiofanato metílico + piraclostrobina
Fungicida + Fungicida /
Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTES ACTIVOS:		
Tiofanato metílico: dimetil 4,4'-(o-fenilen) bis (3-tioalofanato). (Equivalente a 450 g de i.a./L.a 20°C)	% EN PESO 36.90%
Piraclostrobina: metil {2-[1-(4-clorofenil)- pirazol-3-iloimetil] fenil} (metoxi) carbamato. (Equivalente a 50 g de i.a./L. a 20°C)	4.10 %
INGREDIENTES INERTES: Colorante, dispersante, anticongelante, emulsificantes, antiespumante, bactericida, espesante y solvente o vehículo.....		59.00 %
TOTAL:		100.00 %

Reg: RSCO-MEZC-1301Y-301-064-041

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

Acronis® es un fungicida con acción protectora y curativa; inhibe la germinación de la espora y controla el crecimiento del micelio y la esporulación. Su aplicación se realiza tratando la semilla antes de la siembra, proporciona protección durante la germinación y la primera etapa de desarrollo del cultivo.

CULTIVO	Enfermedad	DOSIS mL / 100 kg de semilla	OBSERVACIONES
Maíz (sin límite)	Pudrición de raíz <i>Fusarium sp.</i>	100 – 200	Se recomienda tratar la semilla de maíz antes de la siembra. El producto debe diluirse en 500 mL de agua para asegurar la buena impregnación para 100 kg de semilla. Una vez seca la semilla se procede a sembrarla de acuerdo con las prácticas culturales acostumbradas.
Trigo Cebada Centeno Avena (sin límite)	Pudrición de raíz <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia spp.</i>	100 – 300	Se recomienda tratar la semilla antes de la siembra. El producto debe diluirse con un volumen de aplicación de 1-2 L de agua /100 kg de semilla.
Soya Frijol Frijol ejotero Alubia Haba Garbanzo Lenteja Chícharo Cacahuete Jícama (sin límite)	Damping off <i>Rhizoctonia sp.</i> <i>Fusarium sp.</i>	100 - 200	Realizar una aplicación en tratamiento a la semilla al momento de la siembra; con un volumen de aplicación de 70mL de agua / 100 Kg de semilla.
Algodón (SL)	Damping off <i>Fusarium sp.</i> <i>Rhizoctonia sp.</i>	1-2 mL / Kg de semilla	Realizar una aplicación en tratamiento a la semilla, previo a la siembra por el método de slurry o garapiñado.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
El tiempo de reentrada: Inmediato después de haberse sembrado.

Método para preparar y aplicar el producto.

El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Utilice el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta.

Recomendamos agitar el producto de forma previa al tratamiento.

Acronis[®] es una formulación que debe diluirse en agua suficiente para asegurar una buena impregnación de la semilla a tratar, el cual deberá efectuarse sólo con equipo adecuado y diseñado para este fin con el objeto de obtener una buena impregnación, cubrimiento uniforme y evitar daño a la semilla.

Contraindicaciones.

La semilla tratada deberá etiquetarse con la siguiente leyenda: "ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON FUNGICIDAS, NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE".

Acronis[®] no debe aplicarse sin el equipo de protección personal necesario. No tratar mayor cantidad de semilla de la necesaria para la siembra, los sobrantes deberán germinarse para evitar su uso con fines alimenticios o forrajeros. Asegúrese que la semilla tratada quede completamente cubierta al momento de la siembra.

Acronis[®] no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

No aplicar cuando existan fuertes corrientes de aire (más de 15 km/h), ni cuando exista temperatura alta (más de 28°C) o cuando esté lloviendo. El intervalo de cosecha y tolerancias aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar lo establecido en el país destino.

Incompatibilidad.

No mezclar **Acronis**[®] con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, se hará con productos registrados en los cultivos aquí indicados; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

"Manejo de Resistencia"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com