

FICHA TÉCNICA **PONCHO® SUPER**

Clotianidin + tiodicarb

Insecticida/ Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Clotianidin: (E)-1-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina	11.48
(Equivalente a 140 g de i.a./L a 20°C)	
Tiodicarb: (3EZ, 12EZ)-3,7,9,13-TETRAMETIL-5,11-dioxa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-dien-6,10-diona	32.79
(Equivalente a 400 g i.a./L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES:	
Colorante, anticongelante, dispersante, emulsificante, adhesivo, relleno, antiespumante, preservativos, espesante, solvente	55.73
Total	100.00 %

REGISTRO SANITARIO: RSCO-INAC-MEZC-1701-0681-064-44.27

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

CULTIVO (SL)	PLAGAS		DOSIS	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Maíz Sorgo	Trips negro	<i>Caliothrips phaseoli</i>	285 a 350 mL / 80000 semillas	Realizar una aplicación a la semilla previo a la siembra
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
Frijol Soya	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	215 a 285 mL/ ha	Con objeto de realizar una dosificación precisa del producto, es recomendable que se aplique en “slurry” utilizando equipo para tratamiento de semilla.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Limite

Tiempo de reentrada: 4 horas

*La variación de la dosis dependerá del historial de infestación de las plagas en la zona.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agitar el producto antes de abrir el envase. Para abrir el envase utilice la tapa, colocándola de forma invertida sobre el recipiente y girándola para que la pestaña corte el sello de seguridad. PONCHO SUPER es una formulación diseñada para aplicarse en tratamiento de semilla. Mezcle la cantidad de PONCHO SUPER calculada, según dosis y cantidad de semilla a tratar, con la cantidad de agua necesaria para que la semilla quede bien impregnada con el producto y seguir las instrucciones del equipo utilizado. La cantidad de agua dependerá del tipo y tamaño de semilla.

CONTRAINDICACIONES

No tratar mayor cantidad de semilla que la necesaria para la siembra. En caso de excedentes de semilla tratada, ésta no deberá ser destinada para consumo humano o forraje, por lo que se recomienda que sea germinada y/o destruida. Deberá además asegurarse que la semilla quede completamente cubierta o enterrada al momento de la siembra. La semilla tratada deberá ser etiquetada con la siguiente indicación. **“ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON CLOTIANIDIN + TIODICARB, NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE”**.

Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar las tolerancias e intervalos establecidos en el país destino.

FITOTOXICIDAD

Si la semilla ha sido almacenada durante un periodo largo y/o si las condiciones son adversas para la germinación (temperatura inferior a 10°C), le sugerimos hacer una prueba de germinación con el producto antes de aplicarlo en forma comercial. También es conveniente hacer la misma prueba cuando se utilicen variedades o híbridos de reciente introducción al mercado.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No se recomienda PONCHO SUPER en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Transporte este producto en su envase original, perfectamente cerrado y claramente etiquetado, y almacene en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado. Nunca transportar o almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com