

FICHA TECNICA

Orkestra®

fluxapyroxad + piraclostrobina
Fungicida / Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il) pirazol-4-carboxamida..... (Equivalente a 167 g de i.a./L a 20°C)	14.4 %
Piraclostrobina: metilo {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil] fenil} (metoxi) carbamato..... (Equivalente a 333 g de i.a./L a 20°C)	28.7 %
INGREDIENTES INERTES: Anticongelante, dispersantes, humectante, antiespumante, espesante, bactericida y solvente.	56.90 %
TOTAL:	100.0 %

REG. RSCO-FUNG-0398-0337-064-43.1

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN
MÉXICO POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.**
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
CP 03710, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 01 (55) 5325-26-00

“INSTRUCCIONES DE USO”

Orkestra® tiene acción preventiva y curativa. Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio en el desarrollo de los hongos. Se recomienda usar **Orkestra®** de manera preventiva junto con una estrategia de manejo de resistencia, pero también es efectivo para controlar los ataques de hongos existentes.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Papa (7)	Costra negra <i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 – 2.0	Realizar una aplicación a la semilla al fondo del surco, al momento de la siembra, con un volumen de aplicación de 600 a 700 L de agua / ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 4 horas después de la aplicación.

Método para preparar y aplicar el producto.

Orkestra® se aplica con equipo de aspersión usando el volumen de caldo de aspersión recomendado.

Se sugiere utilizar boquillas de cono hueco a una presión de aspersión de 50 psi.

Preparación del caldo de aspersión. Agregue agua al tanque de mezclado hasta las $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, luego agregue la cantidad necesaria de **Orkestra®** y llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante.

Contraindicaciones.

Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. No aplicar a temperaturas mayores a 28°C ó cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicados si se usa de acuerdo con las recomendaciones de uso.

Incompatibilidad.

No se recomienda **Orkestra®** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“Manejo de Resistencia”.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com