



LISTO PARA USAR

RATICIDA/RODENTICIDA CEBO EN BLOQUES

Contenido:

Flocoumafen	-----	0.005% (p/p)
Inertes c.s.p.	-----	100,0 % (p/p)
Amargante : benzoato de denatonio		

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

MATA CON UNA SOLA INGESTIÓN

*Venta restringida a entidades especializadas.
Prohibida su venta libre*

Contenido neto :

Lote

Vencimiento

**ATENCIÓN – CUIDADO
(CALAVERA)
VENENO**

Venta autorizada por MGAP – Registro N°1276
Venta autorizada por IMM – Registro N°115
Venta autorizada por MSP – Registro N°55.656

USO AGRÍCOLA

Fabrica:

BASF plc.
St Michaels Industrial Estate
Widnes Cheshire, WA8 8TJ
Reino Unido

Firma registrante:

BASF Uruguaya S.A.
World Trade Center, Torre A, Oficina 801
Luis Alberto de Herrera 1248
Teléfono: (+598)2628 1818
Montevideo

Almacenaje:

Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de los alimentos y del alcance de los niños y de personas irresponsables. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.

(CUERPO IZQUIERDO)

Precauciones, indicación de veneno y antídotos:

Familia química: Cumarina

Acción Tóxica: Anticoagulante

Clasificación toxicológica: Clase III (tres) (IPCS/OMS, 2009). Ligeramente peligroso

Antídoto: Vitamina K1 - Fitomenadiona

Primeros auxilios:

En caso de ingestión no provocar el vómito.

En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usar.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO (2)1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN, INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Evitar todo contacto con la boca, la ingestión, la inhalación y el contacto con la piel y los ojos. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios.

Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Solo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y animales domésticos.

No aplicar en conducto de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de productos de forma segura.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico

Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico

Toxicidad para abejas: Por el modo de uso no representa riesgo

“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”

Disposición final de envases:

Una vez que el envase esté vacío perforar el mismo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases luego de realizado el triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS INEXPERTAS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMESTICOS, VESTIMENTAS NI MEDICAMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

(CUERPO DERECHO)

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Storm es un rodenticida anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones, a los que

mata con una sola dosis (una ingestión). La muerte se produce varios días después de la ingestión de la dosis letal, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el Storm

Cultivo	Plaga		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
Areas agrícolas	Rata negra de las casas Rata de las casas Raton doméstico	Rattus rattus Rattus norvegicus Mus musculus	1.25 a 4.5 Kg. de cebo por Há Según la intensidad del ataque.
Silos	Rata negra de las casas Rata de las casas	Rattus rattus Rattus norvegicus	3 bloques de 4 g cada 5 mts y 1 bloque por cueva o madriguera
Galpones	Ratones	Mus musculus	1 bloque de 4 g cada 2 mts

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Storm se presenta pronto para su uso

En silos y galpones: Efectuar previamente una recorrida por el local para determinar el lugar de entrada de los roedores, caminos, cuevas, etc.

Colocar los bloques de **Storm** preferentemente cubiertos con maderas, tejas, azulejos, etc., para evitar el acceso a ellos de otras especies animales y para que los roedores se alimenten protegidos.

Para el control de ratas grises o de noruega, colocar los cebos de 4g de **Storm** en lugares por donde estas transitan, rincones oscuros, cerca de las fuentes de agua, etc.. Para el control de ratas negras o de los tejados debe colocarse el cebo además por los lugares por donde las ratas suben, en el techo, cerchas, caños y en lugares que protejan los alimentos.

Para el control de ratones, colocar 1 bloque de 4g de **Storm** cada 2mts en la zona de influencia de los ratones (15 mts de la cueva aprox.).

En cultivos: Colocar alrededor del cultivo, en caminos y entradas de cuevas de ratas. En cultivos de arroz la mejor época es desde 8 semanas antes de la floración hasta la misma. La dosis aproximada es de 1kg por Há distribuidos los bloques de **Storm** como se ha indicado.

Época de aplicación: Cuando aparezcan los indicios de la plaga.

Frecuencia de aplicación:

En galpones y silos: Examinar a los 3 días después de la aplicación, reponiendo los bloques que hayan sido consumidos. Repetir la operación a los 4 días de la anterior, colocando un nuevo bloque en las entradas a las cuevas. Repetir esta operación cada 7 días, reponiendo los bloques de **Storm** consumidos. Normalmente luego de 3 ó 4 inspecciones se eliminan los roedores.

En cultivos: Reponer los bloques de **Storm** que hayan sido consumidos. A lo sumo 3 a 4 reposiciones son necesarias para eliminar la infestación.

Tiempo de espera: no corresponde.

Contraindicaciones: No tiene.

Compatibilidades: Dada la forma de uso no debe ser mezclado o aplicado junto con ningún plaguicida.

Banda de color **azul** con la frase "CUIDADO"

La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta



Pictogramas:

- Mantener fuera del alcance de niños
- Manipuleo de cebos: botas, guantes, máscara
- Aplicación: overol, protector facial, guantes, botas
- Lavado de manos con abundante agua
- Tóxico para peces
- Tóxico para animales domésticos
- No fumar