

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO - AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICA- MENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto. • No utilice equipos con pérdidas. • No destranque boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca. • No distribuya el producto con las manos desprotegidas. • Clase Toxicológica II: Moderadamente peligroso.

**PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación y aplicación. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre otros cultivos.

**PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:** Evite el contacto con el área de aplicación. Aplique solamente las dosis recomendadas. No aplique el producto en presencia de fuertes vientos, contra el viento o en las horas más calientes. Use overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial, sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma. No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas.

**PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:** Mantenga alejada del área después de la aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Cuando las máquinas pulverizadoras utilizadas con ATECTRA® necesitan emplearse para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con abundante agua.

**REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.** Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales. Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia.

**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:** Cortar toda aplicación del producto a un mínimo de 10 metros de cualquier curso de agua. Evite la contaminación ambiental. Preserve la naturaleza. Producto ligeramente toxico para aves y peces. Virtualmente no para abejas. No contamine cursos de agua.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantenga el producto cerrado en su envase original. El lugar debe ser trancado, exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros. El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.

**DERRAMES:** Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de agua o cursos de agua.

**EN CASO DE ACCIDENTES:** Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590 o al Centro Tocológico Nacional (021) 220-418.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de INGESTIÓN accidental, NO PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente lave inmediatamente la boca y dele de beber agua lentamente y vaya inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, etiqueta y/o folleto del producto. En contacto con los OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de contacto con la PIEL, quite las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

**NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica:** II Moderadamente Peligroso **Síntomas de intoxicación:** No se han reportado casos de intoxicación. **Antídoto:** No se conoce ningún antídoto específico. **Tratamiento:** Tratamiento sintomático.

**CONSULTAS DE INTOXICACIÓN Centro de Toxicología Nacional: (021 – 220 418)**



We create chemistry

# Atectra® BV

Herbicida

**Grupo Químico:** Acido benzoico

**Formulación:** Concentrado soluble (SL)

Herbicida Post-emergente que controla malezas de hoja ancha

**Composicion**

Sal de diglicolamina de Dicamba: sal de 2-(2-aminoetoxi) etanol del acido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico .....70,8% \* p/v  
Inertes y solventes sp.....100%  
\*Equivalente a 48 % p/v Dicamba acido

**N° reg SENAVE**

**N° certificado libre venta**

N° lote	Ver en otro lugar del envase
Fecha fabricación y vencimiento	

**FABRICANTE**

BASF Corporation  
Tel: (409) 981-5000  
14385 West Point Arthur Road  
Texas – Estados Unidos

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO**

**POR:**

**REGISTRANTE**

BASF Paraguay S.A.  
N° reg SENAVE 30  
Tel: +595 21 220790  
Estados Unidos 415, Piso 5°  
Representante en Paraguay  
de BASF SE - 67056 -  
Ludwigshafen – Alemania

## Contenido neto:

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)  
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR**

No inflamable - No explosivo – No corrosivo

© Marca registrada BASF

**GENERALIDADES**

ATECTRA® BV es un herbicida Post-emergente que controla malezas de hoja ancha (latifoliadas). Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos y en distintos estados de desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. ATECTRA® BV posee acción sistémica, absorbiéndose por hojas y raíces de las malezas, y translocándose a toda la planta. Los mejores resultados se obtendrán tratando malezas de 3 a 4 hojas y rosetas no mayores de 10 cm de diámetro, en activo crecimiento.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**Preparación:** ATECTRA® BV debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego agregar el producto ATECTRA® BV con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** ATECTRA® BV debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.

**Aplicación terrestre:** Aplicar ATECTRA® BV con un volumen mínimo de agua de 80-100 litros/ha, con presión de 2.8-4.1 bar (40-60lb/pulg2) y picos de abanico plano con inyección de aire (anti-deriva). Asegurar que los picos o boquillas estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a una altura suficiente para garantizar una cobertura uniforme y completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

**Lavado de Equipos:** Es importante limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las siguientes recomendaciones deben respetarse en forma estricta: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer re-circular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas

**RECOMENDACIONES DE USO:**

Los mejores resultados se obtendrán tratando malezas descriptas en un estadio de 3 a 4 hojas y rosetas no mayores de 10 cm de diámetro y en activo crecimiento. Las dosis más bajas, dentro de los márgenes recomendados se deben utilizar cuando las condiciones (temperatura, humedad y tamaño de malezas sean óptimas. A medida que las mismas vayan siendo adversas (sequía, bajas temperaturas, malezas grandes) se usaran las dosis máximas recomendadas. Se sugiere aplicar ATECTRA BV en mezcla con herbicidas como 2,4 D, Metsulfuron, Glifosato, etc. según las siguientes recomendaciones:

Cultivo	Dosis de uso y mezclas	Momento de aplicación en el cultivo
Trigo, Cereales de invierno	100-200 cc/ha + 3-5 gr. i.a./ha de Metsulfuron + Adyuvante (*) 150-200cc/ha + Adyuvante (*)	Desde el inicio al fin del macollaje. Desde la 2da ó 3era hoja hasta el final del macollaje. En ausencia de malezas crucíferas (nabo, nabon, mostacilla)
Maíz, Sorgo	150-200 cc/ha + Adyuvante (*)	Desde la 2da hoja hasta la 8va hoja del cultivo aplicar en cobertura total sobre el mismo. Desde la 8va hoja hasta floración, aplicar con caños de bajada. (aplicación dirigida)
Caña de Azúcar	200-400 cc/ha + 1040-2080 cc/ha de 2,4 D (sal amina 72% p/v)	Desde el inicio del macollaje del cultivo hasta la aparición de los primeros canutos.
Soja	400-500 cc/ha + Glifosato (1.000 a 2000 gr.i.a/ha)	Aplicación en Barbecho previo a la siembra de Soja. Aplicación a ser realizada mínimo 30 días antes de la siembra. (**)
Maíz, Sorgo, Trigo, Avena, Arroz	400-500 cc/ha + Glifosato (1.000 a 2000 gr.i.a/ha)	Aplicación en Barbecho previo a la siembra del cultivo.

(\*) Adyuvante No Ionico a razon de 250 cc/100 lt/caldo (Ej. Dash HC).  
(\*\*) Entre la aplicación de Atectra BV y la siembra deben transcurrir al menos 30 días con una precipitación superior a 100 mm. durante dicho periodo.  
No aplicar en suelos con contenido de Materia Organica inferior a 2%.

**Atectra® BV, en las dosis y mezclas recomendadas controla las siguientes malezas:**  
Toro rafi (*Acanthospermum* spp), Gambarrusa (*Alternanthera philoxeroides*), Kaa-runi (*Amaranthus* spp), Altamisa (*Ambrosia eliator*), Picon (*Bidens pilosa*), Ka'a ruru pé (*Boerhavia diffusa*), Nabo (*Brassica* spp), Quinoa (*Chenopodium album*), Ka aré – Paico (*Chenopodium ambrosioides*), Santa lucia (*Commelina* spp), Mbuy o Buva (*Corysca* spp), Falsa cerraja (*Emilia sonchifolia*), Lecherita (*Euphorbia heterophylla*), Picon blanco (*Galinsoga parviflora*), Vira Vira o Macela (*Gnaphalium spicatum*), Soja guacha (*glycine max*), Campanilla o Ysypo-i (*Ipomoea* spp), Girasol guacho (*Helianthus annuus*), Cuatro cantos (*Leonorus sibiricus*), Falso trébol (*Oxalis corniculata*), Ka'a piky (*Parietaria debilis*), Ka'a tai (*Polygonum persicaria*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Rabano (*Raphanus* spp), Ypé rupá (*Richardia brasiliensis*), Lengua de vaca (*Rumex obtusifolius*), Tapérvyá o café silvestre (*Senna obtusifolia*), Typyxa hú (*Sida* spp), Araxixu (*Solanum americanum*), Espina colorada (*Solanum sisymbriifolium*), Cerraja (*Sonchus oleraceus*), Hierba caliente (*Spermacoce latifolia*)

**RESTRICCIONES DE USO:** Se deben evitar las aspersiones directas de ATECTRA® BV o sus derivas sobre cultivos sensibles.

**Periodo de Carencia:** Aplicar hasta 30 días antes de la cosecha.  
**Reingresoal área tratada:** No re-ingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado en la superficie de las hojas.  
**Compatibilidad:** Para mezclas específicas consulte con el departamento técnico de BASF®.  
**Fitotoxicidad:** Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

**NOTA:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento

