



We create chemistry

(cuerpo central)

LEA LA ETIQUETA
AGITESE BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR

XANTHO®

Fungicida

Principio Activo

**Contenido
en volumen**

Fluxapyroxad	50 grs/lt
Pyraclostrobin	81 grs/lt
Epoxiconazole	50 grs/lt

Tipo de formulación: Concentrado emulsionable (EC)

Grupo químico: Fluxapyroxad - Carboxamida
Pyraclostrobin – Estrobilurina
Epoxiconazol - Triazol

Fabricante:

BASF S.A. Avenida de las Naciones Unidas, 14.171 ; Torre Crystal ; 14°andar. CEP 04794-000 ; Sao Paulo – Brasil.

BASF Española S.L. Ctra.Nacional 340 km 1156 ,43006 Tarragona – España.

BASF Agri-Production SAS. Z.I. Lyon Nord. Rue Jacquard – 69727 Genay Cedex – Francia.

**Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –
Registro Nro. 4119**

Firma registrante:

BASF Uruguay S.A. World Trade Center, torre A, of.801 – Luis Alberto de Herrera 1248
Teléfono (+598)2628 1818, Montevideo, Uruguay

USO AGRICOLA

Lote N°

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto:

Pictograma: Triple Lavado

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original



We create chemistry

etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".®

Marca Registrada de BASF

(Cuerpo derecho)

Generalidades, modo de acción e instrucciones para su uso:

XANTHO® es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción para el control de enfermedades foliares en los cultivos de soja, trigo y cebada. Actúa de forma preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades fúngicas sobre las hojas expuestas en el momento de la aplicación.

XANTHO® presenta buena persistencia en el cultivo (6 a 8 semanas), protegiéndolo de la mayoría de los hongos patógenos que lo afectan (Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y Oomicetos).

XANTHO® es un fungicida formulado a base de tres ingredientes activos: 1) Fluxapyroxad, carboxamida inhibidor de la fosforilación oxidativa a nivel de la succinato-UQ dehidrogenasa (Complejo II); detiene la respiración celular a nivel de las mitocondrias interfiriendo en el transporte de electrones del complejo II, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos. Actúa sobre todos los estadios de desarrollo del hongo, inhibiendo la germinación de esporas, desarrollo y penetración de los tubos germinativos y el crecimiento del micelio. Esta acción junto con su elevado nivel de actividad producen efectos preventivos y curativos duraderos; 2) Epoxiconazol, triazol inhibidor de la síntesis del ergosterol, con acción sistémica ascendente (acropétala) y de larga residualidad y 3) Pyraclostrobin, estrobirulina con acción sobre las esporas y estructuras de los hongos fitopatógenos, actúa sobre la cadena de respiración en la mitocondria, es episistémico (translaminar y sistémico local).

XANTHO® proporciona una excelente acción de protección debido a su acción en la inhibición de la germinación de esporas, el desarrollo y la penetración de los tubos germinales.

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/Ha	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Trigo	Roya anaranjada Roya del tallo Roya amarilla Mancha amarilla Septoriosis	<i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia graminis</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Drechslera tritici repentis</i> <i>Septoria tritici</i>	1 – 1,2	Aplicar en forma preventiva cuando se den las condiciones predisponentes favorables al desarrollo del hongo o tan pronto se detecte la enfermedad. A partir de fin de macollaje-inicio de encañado. Ver (1)
Cebada	Roya de la hoja Mancha en red Mancha borrosa Ramularia	<i>Puccinia hordei</i> <i>Helminthosporium teres</i> <i>Helminthosporium sativum</i> <i>Ramularia collo-cygni</i>		

	Roya Asiática	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	0,8	Ver (2)
Soja	Enfermedades de Fin de Ciclo Mancha púrpura Mancha parda Oidio Mancha ojo de rana	<i>Cercospora kikuchii</i> <i>Septoria glycines</i> <i>Microsphaera diffusa</i> <i>Cercospora sojina</i>	0,8	Aplicar en forma preventiva cuando se den las condiciones predisponentes favorables al desarrollo del hongo o tan pronto se detecte la enfermedad a partir de fin de floración (R3). Ver (2)
Maiz	Roya del maíz Tizón foliar	<i>Puccinia sorghi</i> <i>Exserohilum turcicum</i>	1 – 1,2	Aplicar en forma preventiva desde 8 a 10 hojas o inmediatamente que aparezcan los primeros síntomas a partir de 6 hojas. Monitorear desde 4 - 6 hojas. Repetir en caso necesario.
Brassica napus var. napus (Colza) Brassica carinata	Alternaria Leptosphaeria Sclerotinia	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1,2	Iniciar las aplicaciones ante la aparición de síntomas. Para control de <i>Leptosphaeria maculans</i> desde el estado fisiológico B6-C1, para <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> desde el estado fisiológico F1 a G1 y para <i>Alternaria brassicae</i> desde el estado fisiológico D1, con un máximo de 2 aplicaciones por año.

Observaciones:

- (1) Cebada: debido al rápido desarrollo de la *Ramularia* y *Mancha borrosa* en Cebada, recomendamos aplicar en forma preventiva, antes del ataque de la enfermedad, tan pronto se den las condiciones climáticas favorables para su desarrollo.
- (2) Soja: es conveniente realizar evaluaciones periódicas del cultivo para detectar la eventual aparición de pústulas de Roya Asiática. En caso de confirmarse su presencia, aplicar XANTHO desde el comienzo del período reproductivo (R1). Se sugiere evaluar el estado sanitario de los cultivos próximos para iniciar los tratamientos. En caso de presencia de Roya Asiática en la zona, se recomienda aplicar XANTHO preventivamente a fin de floración – inicio de formación de vainas (R3), obteniéndose así protección para Roya Asiática y demás enfermedades foliares. Según las condiciones del año para el ataque de la enfermedad, se deberá realizar una o más aplicaciones para obtener buen control.

Recomendaciones: En el caso de aplicaciones curativas o con alta presión de las enfermedades recomendamos el agregado del coadyuvante Dash HC a razón de 300 cc/ha.



We create chemistry

Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones:

Aplicar en forma preventiva o tan pronto se detecte la enfermedad. Luego de la aplicación se deberá continuar con los monitoreos correspondientes, en caso de llegar nuevamente a los niveles críticos se deberá volver a aplicar.

Modo de aplicación y técnica de aplicación:

XANTHO debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llene el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad ó $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad. Luego con el agitador en marcha agregue XANTHO, complete con agua y mantenga la agitación durante la aplicación.

XANTHO puede aplicarse con cualquier equipo pulverizador provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.

Para aplicaciones terrestres se deben utilizar picos “cono hueco” o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg². El agua debe ser suficiente para mojar bien todas las partes de la planta. No utilizar volúmenes inferiores a 200 lts/há.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Tiempo de espera:

Soja: 14 días. Trigo y Maíz: 38 días. Cebada: 60 días. Brassica: 45 días (tiempo de carencia establecido en base a tolerancia en grano).

En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al cultivo: Esperar al completo secado del producto sobre las hojas antes de reingresar al área tratada.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

XANTHO es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de soja, maíz, trigo y cebada. Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no



We create chemistry

es fitotóxico para los cultivos indicados. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Consulte con nuestro departamento técnico.

Resistencia: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

(Cuerpo izquierdo)

Precauciones y advertencias:

Clasificación toxicológica: Clase III (tres) Ligeramente peligroso (IPCS/OMS 2009)

Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT (Hospital de Clínicas 7° Piso) - TELEFONO: (2)1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión no provocar el vómito. No dar nada a beber.

En caso de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. De persistir la irritación concorra al médico.

En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Advertencia sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos, aves y abejas:

Producto poco tóxico para aves, altamente tóxico para peces y ligeramente tóxico para abejas.



We create chemistry

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases inutilizados al centro de recolección más cercano.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

"USO AGRICOLA"

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento.

Banda de color azul con la frase "CUIDADO"



La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta

Pictogramas:

- Mantener fuera del alcance de niños
- Manipuleo de líquidos: delantal, overol, botas, guantes y protector facial



We create chemistry

- Aplicación: overol, guantes, botas, mascara de filtro
- Lavado de manos con abundante agua
- Tóxico para peces
- No fumar