

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de los oximinoacetatos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
- **Ingestión:** no inducir el vómito. Solo si el afectado se encuentra consciente, se le puede dar un poco de agua por el enjuague de su boca. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No es conocido ningún antídoto específico.

Riesgos ambientales: Strobry® SC, en condiciones normales de uso, no es tóxico para abejas, no peligroso para aves. Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**)
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

We create chemistry

Strobry® SC

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida de contacto con prolongada persistencia de acción, especialmente indicado para el control de las enfermedades indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

Kresoxim-metilo* 50% p/v (500 g/L)
Coformulantes, c.s.p. 100% p/v (1 L)
* (E)-metoxiimino[α -(σ -toliloxi) σ -tolil]acetato de metilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2379

NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: Litro

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Formulado por:

BASF S.A.

Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-40
- Guaratinguetá - SP, Brasil

BASF Española

Ctra Nacional 340 km 1156,
43006 Tarragona, España

Importado y
Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851 - Casilla 3238
Fono: (56) 22640 7000
Santiago - Chile
Representante en Chile
de BASF S E

® Marca Registrada BASF.



CUIDADO



RECOMENDACIONES DE USO: **ABRIR AQUI**



Stroby® SC

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Stroby® SC es un fungicida que actúa por inhibición de la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y la esporulación. De esta manera **Stroby® SC** otorga una prolongada persistencia de acción.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Observaciones |
|--|---|--|--|
| Manzanos, Perales | Venturias (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i>) Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 13 cc/100 L agua (mínimo 200 cc/ha en huertos en producción) | Aplicar desde inicio de floración hasta fruto formado en forma preventiva, alternando con fungicidas de distinto modo de acción. Realizar una o máximo dos aplicaciones por temporada pero no consecutivas. Considerar un periodo de protección de 10 a 12 días. En el caso de ocurrir lluvias sobre los 80 mm entre las aplicaciones de Stroby® SC , reducir el intervalo de aplicación de 12 a 8 días. No aplicar más de dos veces por temporada y no realizar la primera o la última aplicación con Stroby® SC u otro fungicida de la misma familia. Las aplicaciones de Stroby® SC también reducen la presión de cancro europeo (<i>Nectria galligena</i>) en madera y previenen la infección de los frutos. Además controlan botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) en la flor de perales y manzanos y reducen la incidencia de corazón mohoso (<i>Alternaria alternata</i>) en manzanos. |
| Manzanos | Ojo de buey (<i>Neofabraea alba</i>) | 8 - 13 cc/100 L agua (mínimo 250 cc/ha en huertos en producción) | Aplicar en precosecha, desde 45 días antes de cosecha, repitiendo cada 10-15 días, según condiciones de infección (lluvias), alternando con fungicidas de distinto modo de acción. No aplicar más de dos veces por temporada. Ajustar la concentración (entre los rangos recomendados), que corresponda al volumen de agua requerido para un buen cubrimiento de los frutos, y que permita aplicar un mínimo de 250 cc/ha. |
| Vides (vid de mesa, vinífera, pisquera) | Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Oídio (<i>Uncinula necator</i>) Cladosporium (<i>Cladosporium</i> sp.) Pudrición ácida (<i>Rhizopus</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp., <i>Botrytis cinerea</i>) | 10 - 13 cc/100 L agua (mínimo 200 cc/ha en plantas en plena producción) | Control de Oídio y Botritis: aplicar Stroby® SC cada 20 días en forma preventiva, en el período desde brote de 70 a 80 cm hasta cierre de racimos, alternando con fungicidas de diferente modo de acción. En el caso de localidades o variedades especialmente susceptibles a oídio (ej: variedad Crimson Seedless), aplicar Stroby® SC en forma preventiva cada 15 días. Control de Cladosporium: realizar una aplicación preventiva de Stroby® SC 20 a 30 días antes de cosecha cuidando de alternar posteriormente con productos de diferente modo de acción. Control de Pudrición ácida: aplicar una vez Stroby® SC en forma preventiva, en pintura alternando con productos complementarios de diferente modo de acción. Stroby® SC no afecta la fermentación alcohólica del mosto. En todos los casos, ajustar la concentración (entre los rangos recomendados), que corresponda al volumen de agua requerido para un buen cubrimiento, y que permita aplicar un mínimo de 200 cc/ha. En vides aplicar un máximo de 3 veces por temporada, considerando las aplicaciones para todas las enfermedades objetivo. |
| Tomates | Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) | 20 cc/100 L agua | Realizar las aplicaciones en forma preventiva, desde 15 días después de trasplante hasta precosecha, cada 10 a 15 días, dependiendo de la presión de la enfermedad, alternando con productos de diferente modo de acción y no utilizar Stroby® SC en más del 50% de las aplicaciones contra botritis en la temporada. Aplicaciones por temporada: máximo 2. Usar un mojado de 300 a 1.000 L/ha, según el tamaño de las plantas para asegurar un buen cubrimiento. |
| Ajos (dientes, semilla de ajo) | Penicillium (<i>Penicillium hirsutum</i>) | 20 cc/100 L de agua | Sumergir los dientes (semillas de ajo) por 6 horas en una suspensión de Stroby® SC y posteriormente sembrar. Asegurar que el volumen de la solución permita que las semillas queden sumergidas en ésta. Como referencia una dosis de 2.000 kg de semillas pueden ser tratada en alrededor de 200-400 L de agua. Aplicaciones por temporada: 1. |

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Stroby® SC**. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

Incompatibilidad: No mezclar con productos que contengan clorpirrifos.

Compatibilidad: **Stroby® SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo en caso de mezclas específicas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

En ajos, **Stroby® SC** puede ser mezclado con nematocidas en el mismo tratamiento.

Fitotoxicidad: **Stroby® SC** usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta no es fitotóxico en los cultivos indicados en la etiqueta. **Stroby SC** es fitotóxico en cerezos.

Periodo de Carencia: Manzanos, perales, vides, y tomates: 7 días. La carencia en ajos no aplica. En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso: No hay restricciones una vez secado el depósito aplicado, 2 horas es suficiente. Para animales no aplica tiempo de reingreso, ya que el producto no está indicado para cultivos destinados a pastoreo.

Nota:

Para mantener la actual eficacia de **Stroby® SC** recomendamos en: **Manzanos y perales:** Hacer un máximo de dos aplicaciones por temporada, pero no en forma consecutiva, realizando antes y después aplicaciones con fungicidas de diferente grupo químico. No realizar la primera ni la última aplicación de la temporada con **Stroby® SC** u otro fungicida de la misma familia.

Vides: No realizar más de dos aplicaciones consecutivas, realizando antes y después aplicaciones con productos de diferente grupo químico y, aplicar máximo 3 veces en la temporada **Stroby® SC** u otros fungicidas en base a estrobilurinas.

Con el uso repetido de **Stroby® SC** o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Stroby® SC** obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. **Según clasificación FRAC**, el ingrediente activo de **Stroby® SC**, kresoxim metilo pertenece al grupo C3.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de los oximinocetatos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
- **Ingestión:** no inducir el vómito. Solo si el afectado se encuentra consciente, se le puede dar un poco de agua por el enjuague de su boca. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No es conocido ningún antídoto específico.

Riesgos ambientales: Strobry® SC, en condiciones normales de uso, no es tóxico para abejas, no peligroso para aves. Es tóxico para peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**)
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

We create chemistry

Strobry® SC

**Fungicida
Suspensión concentrada (SC)**

Fungicida de contacto con prolongada persistencia de acción, especialmente indicado para el control de las enfermedades indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

Kresoxim-metilo* 50% p/v (500 g/L)
Cofomulantes, c.s.p. 100% p/v (1 L)

* (E)-metoxiimino[α-(o-toliloxi)ο-tolil]acetato de metilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2379

NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE

**Lote: Ver en la etiqueta exterior.
Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.**

Contenido neto: Litro

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Formulado por:

BASF S.A.
Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-40
- Guaratinguetá - SP, Brasil
BASF Española
Ctra Nacional 340 km 1156,
43006 Tarragona, España

Importado y
Distribuido por
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 - Casilla 3238
Fono: (56) 22640 7000
Santiago - Chile
Representante en Chile
de BASF S E

® Marca Registrada BASF.



CUIDADO

