

FICHA TECNICA

Integrity™

dimetenamida-p + saflufenacil
Herbicida / Concentrado Emulsionable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Dimetenamida-p: (S)-2-Cloro-N-[(1-metil-2-metoxi)etil] -N-(2,4-dimetil-tien-3-il)-acetamida.....	55.04%
(Equivalente a 600 gr de i.a./L a 20°C)	
Saflufenacil: N'-[2-Cloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-3,6-dihidro-1(2H)pirimidinil) benzoil] -N-isopropil-N-metilsulfamida.....	6.24%
(Equivalente a 68 gr i.a./L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES: Emulsificante y solvente.....	38.72%
Total.....	100.00%

REG: RSCO-MEZC-1263-301-009-061

Puede ser nocivo en caso de ingestión

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710 MÉXICO D.F.
TEL. 01 (55) 5325-2600

INSTRUCCIONES DE USO

Integrity™ es un herbicida que se absorbe por raíz, brotes y hojas vía xilema, actúa en pre-emergencia a la maleza y al cultivo. Controla la maleza susceptible reduciendo la división celular. El volumen mínimo de agua a utilizar en aplicación terrestre será de 400-600 L/Ha para asegurar una buena cobertura.

CULTIVO	Maleza	DOSIS L / ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Maíz (SL)	Zacate de agua <i>Echinochloa colona</i> Coquillo <i>Cyperus esculentus</i> Chayotillo <i>Sycios angulatus</i>	1.0 a 1.5	Realizar la aplicación en cobertura total al suelo en pre-emergencia a la maleza y al cultivo.
Maíz (SL)	Achualillo <i>Simsia amplexicaulis</i> Hierba del pollo <i>Commelina erecta</i> Mala mujer <i>Solanum rostratum</i> Aceitilla <i>Bidens pilosa</i> Gigantón <i>Tithonia tubiformis</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Campanita	1.0 a 1.5	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 366.6 – 466.6 L de agua / ha.

	<p><i>Ipomoea purpurea</i> Coquillo amarillo <i>Cyperus esculentus</i> Zacate pata de gallo <i>Eleusine multiflora</i> Fresadilla <i>Digitaria sanguinalis</i> Zacate Blanco <i>Setaria grisebachii</i> Avenilla <i>Eragrostis mexicana</i></p>		
--	--	--	--

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 3 horas después de la aplicación

Métodos para preparar y aplicar el producto.

Forma de abrir el envase. Abra el producto cuidadosamente Evitar todo contacto directo con el producto. Utilice el equipo de protección completo.

Preparación del caldo de aspersión. Agregue agua limpia al tanque del equipo de aplicación aproximadamente a la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad necesaria de **Integrity™** y llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante.

Forma de aplicación. **Integrity™** debe aplicarse con un volumen suficiente que garantice una buena cobertura (400 a 600 L/ha). Aplicar en pre-emergencia a la maleza y al cultivo.

No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado **Integrity™** ya que reduce su efectividad.

Úsese 1.25 L/ha en suelos con contenidos bajos de materia orgánica (<3%) y 1.5 L/ha en suelos con >3% de materia orgánica y/o con alta infestación de maleza.

Contraindicaciones.

No aplicar en suelos mal preparados, no aplique una vez que el cultivo de maíz haya emergido, si la velocidad del viento supera 10 km/hr, detener la aplicación. **Integrity™** es un herbicida pre emergente que se activa con humedad, por lo que deberá aplicar próximo al temporal de lluvias, en caso de no ocurrir lluvia en los próximos 7 días incorpore el herbicida con un riego. En regiones con rotación de cultivo evite residuos en el suelo, no aplicando más de 1.25 L/ha. No sembrar los campos tratados con **Integrity™** con cultivos de hortalizas susceptibles hasta que hayan transcurrido mínimo 8 meses de la aplicación. No aplique **Integrity™** donde siembre cultivos asociados. Evite la contaminación de cultivos cercanos los cuales pueden ser dañados por deriva del herbicida.

Incompatibilidad.

En mezclas de tanque; **Integrity™** es físicamente compatible con las formulaciones; suspensiones concentradas, concentrados emulsionables, gránulos dispersables, suspensiones líquidas, granuladas, con fertilizantes a base de; nitrato de amonio y sulfato de amonio, coadyuvantes, aceite vegetal desnaturalizado (metilado) y aceites minerales.

Sin embargo; se recomienda **NO** mezclar **Integrity™** con pendimetalin en formulación SC, con atrazina 480 en formulación SC en mezcla con aceite vegetal desnaturalizado (aceite metilado), y con productos que contienen 2,4-D amina.

“Manejo de Resistencia”.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DE DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com